

Tqala u treddiġh f'nisa bil-marda ta' Wilson (Wilson's Disease)

Kontraċezzjoni għal mard kroniku tal-fwied ingenerali u speċjalment għall-marda ta' Wilson

Huwa magħruf li pazjenti bil-marda ta' Wilson spiss ikollhom problemi biċ-ċikli mestrwali. Dawn jinkludunuqqas tal-mestrwazzjoni, pirjids rari jew ċikli irregolari. Dan jista' jagħmel il-konċepiment diffiċli. Barra minn hekk, korrimenti ġew osservati f'pazjenti b'marda li ma ġietx ikkurata. Madankollu, r-riskju ta' dan kollu jinnormalizza bit-terapija.

Dan jiġri minhabba il-fatt li il-metabolizmu tar-ram (copper) tajjeb u l-funzjoni normali tal-fwied huma importanti jekk inti tixtieq li toħroġ tqala!

Jekk għandek mistoqsijiet dwar il-ġenetika jew l-iskringing tal-familja, kellek lill-ġinekologu tiegħek, ikkunsidra parir ġenetiku, jew ikkonsulta m'espert f'din il-marda.

B'mod ġenerali, it-tqala ta' pazjenti bil-marda ta' Wilson li jkunu qed jirċievu terapija hija normali.

Il-prevenzjoni tat-tqala fil-marda ta' Wilson hija possibbli permezz ta' apparat gewwa l-utru li fih l-ormoni (li mhumiex mir-ram), ċrieki vaginali jew il-pillola għall-kontroll tat-twelid (Oral Contraceptiv pill / OCP). Madankollu, l-użu ta' kontraċettivi ormonali b'estroġenu għoli mhumiex rakkomandat, għax dan jista' jinterferixxi mat-testijiet tal-funzjoni tal-fwied tiegħek. Jekk tibda kontraċezzjoni ormonali ("OCP") jew tibdel il-preparazzjoni, il-livelli tal-funzjoni tal-fwied għandhom jiġu ċċekkjati fi żmien qasir.

Problemi u perikli għall-omm u t-tarbija b'mod ġenerali f'mard kroniku tal-fwied u b'mod partikolari bil-marda ta' Wilson

Waqt it-tqala, sintomi tal-fwied jew sintomi newroloġiċi severi huma ta' importanza partikolari.

F'każijiet rari, pazjenti bil-marda ta' Wilson u ċirrozi mhux kumpensata tal-fwied (jiġifieri ilma addominali jew suffejra) m'għandhomx jinqabdu tqal.

Dawn l-affarijiet għandhomdejjem jiġu diskussi mal-professjonisti rispettivitiegħek fuq din il-marda.

Wara t-twelid, pazjenti b'sintomi newroloġiċi u psikjatriċi jista' jkollhom problemi biex jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom.

Sfortunatament, it-tqala xi kultant twassal ukoll biex jingħatawxi mediċini, ħafna drabi minhabba l-biza' ta' effetti sekondarji u l-possibiltà ta' ħsara lit-tarbija mhux imwiela. Il-mediċini regolari m'għandhomx jitwaqqfu matul il-konċepiment, it-tqala jew matul it-treddiġh.

Liema medikazzjoni tista' tintuża waqt it-tqala?

Il-mediċini kollha (jiġifieri D-penicillamine, trientine u zinc salts) użati għall-kura tal-marda ta' Wilson jistgħu jintużaw ukoll waqt it-tqala. It-twaqqif ta' dawn il-mediċini huwa perikoluż minhabba li l-funzjoni tal-fwied tal-omm tista' tiddeterjora ħafna. F'dawn iċ-ċirkosatanzi ġew osservati deterjorament newroloġiċi irriversibbli.

Tqala u treddigh f'nisa bil-marda ta' Wilson (Wilson's Disease)

'D-penicillamine'

'D-penicillamine' ilu jintuza għal żmien twil. Għalhekk, għandna l-aktar esperjenza ma din il-medicina waqt it-tqala. Kemm studji fuq l-annimali kif ukoll il-bnedmin iddeskrivew effetti avversi fuq il-fertilità. Mandankollu, dawn ma ġewx osservati fil-bnedmin, wisq inqas fit-tfal b'Wilson.

→ Bħala prekawzjoni - biex inzommu f'mohhna r-rekwiziti tar-ram tal-fetu- id-doża għandha titnaqqas għal 600–900 mg jekk possibbli. Fit-tieni u t-tielet trimestritat-tqala, l-għan huwa il-prevenzjoni ta' 'deficjenza ta' ram fit-tarbija u l-evitar ta' 'disturbi fil-fejtan tal-feriti. Wara l-ħlas, id-doża għandha terġa' tizdied.

Trientine

Studji fuq l-annimali ddeskrivew ukoll effetti li jagħmlu ħsara lill-fertilità lin-nies fuq din il-medicina. Dawn l-esperimenti saru b'dozi għoljin ħafna tal-medicina, u għalhekk hemm dubbji jekk il-livelli baxxi tar-ramli rrizulta ħabba doza għolja humiex responsabbli għal dawn il-malformazzjonijiet. L-ebda effetti negattivi fil-bnedmin ma ġew iddokumentatis'issa..

→ Għal din il-medicina, japplikaw l-istess rakkomandazzjoni bħal D-penicillamine, jiġifieri tnaqqis fid-doża għal idealment 2–3 pilloli jew kapsuli kuljum. Wara l-ħlas, id-doża għandha tizdied għad-dozi ta' qabel il-koncepiment.

Zinc (Żingu)

Mhux magħruf li 'zinc' għandu effett negattiv fuq il-fertilità fil-bnedmin. Ma huma meħtieġa l-ebda aġġustamenti fid-doża ta' din il-medicina

Liema medicini għandhom jingħataw waqt it-tqala?

Jekk toħroġ tqila waqt li qed tieħu D-penicillamine jew trientine, it-tifel/tifla mhux se jsufri!

Anke f'nisa tqala li m'għandhomx il-marda ta' Wilson, mhux kull tarbija titwieled b'saħħitha.

Hemm ukoll studji dwar tqala b'pazjenti li qedgħin fuq il-medicina zinc'. Dawnjuru li t-tqala b'din il-medicina hija normali.

,It-terapija li tinbeda fil-bidu tat-tqala għandha titkompla. Jekk inti tqila, bidla fil-medikazzjoni għandha tiġi evitata kemm jista' jkun!

T-terapija stabbiliti għall-marda ta' Wilson mhumiex perikolużi kemm għall-omm, kif ukoll għall-wild.

Għal żmien twil, kien diskuss jekk mara għandhiex taqleb għal żingu qabel it-tqala. Mandankollu, illum il-gurnata nafu li dan mhux meħtieġ. Il-principju huwa li l-pazjenti bil-marda ta' ta' Wilson jistgħu joħroġu tqal bit-terapija li ikunu fuqha. Mhuwiex neccessarju li ttipprova tiddel it-terapija..

→ Il-livelli tal-funzjoni tal-fwied għandhom ikunu stabbli u l-livelli tar-ramgħandhom ikunu baxxi. Ftit wara d-dijanjozi tal-marda ta' Wilson, sakemm il-livelli tar-ram fil-ġisem ikunu qed jitbaxxew, it-tqala għandha tiġi evitata

Tqala u treddigh f'nisa bil-marda ta' Wilson (Wilson's Disease)

Huwa importanti li ma twaqqafx it-terapija tieghek waqt it-tqala!

Tqala f'cirrozi avanzata tal-fwied

Jekk għandek cirrozi relatata ma' Wilson u varici esofagali (Oesophageal varices) kbar, it-tqala għandha tkun osservata f'centru b'esperjenza kbira f'din il-marda. Jekk inti qed tippjana tqala, l-instrument tal-istonku huwa rrakomandat biex tkun taf jekk hemmx il-presenza ta' varici esofagali jew fl-istonku u jekk huma prezenti kemm humakbar. Il-presenza ta' varici kbar tindika pressjoni sinifikanti fil-fwied, konsegwenza ta' cirrozi. Dintista' iżżid r-riskju ta' komplikazzjonijiet fit-tqala.

F'dawn il-każijiet, l-esperti għandhom iqisu l-aspetti individwali kollha meta jiddiskutu kif għandhom jipproċedu u, fuq kollox, x'tip ta' ħlas jista' jiġi rrakomandat għall-benefiċċju tal-omm u t-tarbija.

It-treddigh

It-treddigh huwa possibli anke jekk tinsab fuq il-medicini D-penicillamine, trientine jew zinc, f'konsultazzjoni mat-tabib tieghek.

Qatt m'għandek twaqqaf il-medicini tieghek għat-treddigh, peress li l-waqfien mit-teħid tal-medicini iżid ir-riskju ta' deterjorament akut.

Peress li m'hemmx data b'saħħitha dwar il-presenza ta' prodotti medicinali fil-ħalib tas-sider, għandu dejjem jiġi meqjuzl-benefiċċju u r-riskju meta omm bil-marda ta' Wilson tkun lesta li tredda' lit-tarbija tagħha.

B'mod ġenerali, it-tobba għandhom tendenza li jagħtu parir kontra t-treddigh, għalkemm xi rapporti wrew livelli normali ta ram fil-ħalib tas-sider f'nisa li qedgħin fuq dawn il-medicini. Madankollu, l-omm għandha dejjem tiddeċiedi għaliha nfisha jekk treddax it-tarbija tagħha jew le.

→ Ħafna ommijiet bil-marda Wilson ireddgħu mingħajr ebda effetti sekondarji. Madankollu, D-penicillamine u trientine jistgħu jaffettwaw lit-tifel/tifla u jwasslu għal defiċjenza ta' ram tat-tifel/tifla. Għalhekk, dan għandu jiġi ċċekkjat mil-pedjatra u jekk il-livelli tar-ram tat-tifel/tifla ikunu baxxi, t-treddigh għandu jieqaf.

Sommarju

- Problemi ta' fertilità jiġruf'pazjenti bil-marda ta' Wilson, f'każijiet mhux ikkontrollati jew mhux dijanjostikati. Jekk l-marda tieghek hija ttrattata sew, hemm ħafna inqas cans ta' -problemi tal-fertilità
- Huwa possibli li persuna tinqabad tqila anke jekk tkun fuq it-terapija
- Jekk il-marda ta' Wilson tieghek hija stabbli, il-funzjoni tal-fwied tieghek hija tajba, u m'għandekx cirrozi jew pressjoni tad-demem għolja, m'hemm l-ebda riskjuli għandek tistenna waqt it-tqala.
- It-terapija bil-medicina qatt m'għandha tiġi interrotta waqt it-tqala. Dan għaliexdan jista' jkun ta' riskju kemm għall-omm u kif ukoll għat-tarbija.
- Kuntatt ma' centru b'esperjenza bil-marda ta' Wilson huwa rrakomandat, speċjalment waqt it-tqala.
- It-treddigh huwa possibli f'pazjenti b'Wilson, iżda huwa rrakomandat li ssir valutazzjoni komprensiva tal-benefiċċji u r-riskji.



Tqala u treddigh f'nisa bil-marda ta' Wilson (Wilson's Disease)

In-Netzwerk Ewropew ta' Referenza RARE-LIVER, il-Grupp ta' Hidma Wilson

I-awturi

Z. Mariño, Barcellona
U. Merle, Heidelberg
I. Mohr, Heidelberg
Chr. Weiler-Normann, Hamburg
K.H. Weiss, Heidelberg

Koordinazzjoni

W. Papenthin, avukat tal-ePAG, Berlin
Marda ta' Wilson e.V.
Id-Dam 119 ta' Zehlendorfer
14532 Kleinmachnow
Telefown + 49 30 80 49 49 84 86
Posta info@morbus-wilson.de
www.morbus-wilson.de